

令和7年度病害虫発生予察注意報第4号

令和7年8月7日
鳥取県病害虫防除所

注意報の概要

7月下旬現在、ナシほ場におけるハダニ類（図1、2）の発生量が平年に比べて多く、早期落葉等の被害の発生が懸念される。今後も、ハダニ類の発生に好適な条件になると見込まれ、発生量の増加が懸念されるため、防除を徹底する必要がある。

病害虫名：ハダニ類

- 1 対象作物 ナ シ
- 2 発生地域 県下全域
- 3 発生時期 やや早い
- 4 発生量 多 い

5 注意報発令の根拠

- (1) 7月下旬のナシの県内巡回調査において、カンザワハダニの寄生葉率は43.1%（平年：4.6%）と平年に比べて高く、10葉当たりの寄生頭数は34.8頭（平年：0.9頭）と平年に比べて多い（表1、2）。
- (2) 7月下旬現在、県予察ほ場（園芸試験場、慣行防除体系）におけるカンザワハダニの10葉当たりの寄生個体数は、0.7頭（平年：0.3頭）と平年に比べて多い。
- (3) 向こう1か月の気象予報（7月31日広島地方気象台発表）から、今後、ハダニ類の発生に好適な条件になると見込まれ、ナシ園における被害の増加が予想される。

6 防除上注意すべき事項

- (1) ほ場のハダニ類の発生状況を確認する。ハダニ類の密度は高温乾燥条件下で急激に高まるので、1葉当たりの成虫数1頭を目安に防除を行う。
- (2) 多発後の散布では十分な効果が認められない事例があるため、少発時からの散布に努める。
また、発生密度が高い園では、散布量を増やし、丁寧に薬剤散布する。
- (3) ハダニ類は、種類によって薬剤効果が異なるので、種類を十分に見極める。
- (4) 防除薬剤は表3を参考とする。また、農薬の使用基準を遵守するとともに、使用上の注意事項を守る。
- (5) 防除を行う際は、農作業安全、熱中症に十分に注意する。



図1 カンザワハダニ成虫



図2 ナシ葉への被害

表1 ハダニ類の寄生葉率 (%) *

調査地点	クワオオハダニ			カンザワハダニ			ナミハダニ		
	本 年	前 年	平 年**	本 年	前 年	平 年**	本 年	前 年	平 年**
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
鳥取市佐治町	0	0	0	3.3	0	0	0	0	0
鳥取市青谷町	0	3.3	5.6	98.3	16.7	16.1	0	0	0
八頭町	0	0	0.3	66.7	0	4.2	0	0	0.7
倉吉市	0	0	0	1.7	0	0	0	0	0
湯梨浜町	0	0	3.2	75.0	6.7	11.7	0	0	0
北栄町	0	0	0	3.3	6.7	0.7	0	0	0
琴浦町	0	0	4.7	81.7	0	3.7	0	0	0
大山町	0	0	0	35.0	8.3	2.8	0	0	0
南部町	0	3.3	0.5	23.0	8.3	2.5	0	0	0
平 均	0	0.7	1.6	43.1	5.2	4.6	0	0	0.1

* ほ場あたり3樹調査（1樹20葉調査）

** 調査地点により調査年数が異なるため、H27～R6 の期間のうち 3 年以上（最大 10 年）の調査結果をもとに平年値を算出した。

表2 ハダニ類の10葉当たりの寄生頭数（頭/10葉）*

調査地点	クワオオハダニ			カンザワハダニ			ナミハダニ		
	本 年	前 年	平 年**	本 年	前 年	平 年**	本 年	前 年	平 年**
	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭
鳥取市佐治町	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0
鳥取市青谷町	0	0.7	1.4	198.3	8.2	4.0	0	0	0
八頭町	0	0	0	29.0	0	0.6	0	0	0.2
倉吉市	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0.1
湯梨浜町	0	0	0.4	34.0	0.8	2.1	0	0	0
北栄町	0	0	0	1.0	1.8	0.2	0	0	0
琴浦町	0	0	1.7	36.5	0	0.6	0	0	0
大山町	0	0	0	6.0	2.0	0.7	0	0	0
南部町	0	0.5	0.1	7.3	2.0	0.5	0	0	0
平 均	0	0.1	0.4	34.8	1.6	0.9	0	0	0.0

* ほ場あたり3樹調査（1樹20葉調査）

** 調査地点により調査年数が異なるため、H27～R6 の期間のうち 3 年以上（最大 10 年）の調査結果をもとに平年値を算出した。

表3 ハダニ類の主な防除薬剤と使用基準*

作物名	農薬の名称	希釈 倍数	使用時期	本剤の 使用回数	IRAC コード**
なし	コロマイト乳剤	1,000～ 1,500 倍	収穫前日まで	1 回	6
	カネマイトフロアブル	1,000～ 1,500 倍	収穫前日まで	1 回	2 0 B
	マイトコーネフロアブル	1,000～ 1,500 倍	収穫前日まで	1 回	2 0 D
	ダニゲッターフロアブル	2,000 倍	収穫前日まで	1 回	2 3
	スターマイトフロアブル	2,000 倍	収穫前日まで	1 回	2 5 A
	ダニコングフロアブル	2,000 倍	収穫前日まで	1 回	2 5 B

*農薬の登録内容は令和7年8月4日現在

**IRAC コードは殺虫剤・殺ダニ剤の作用機構の分類を示す。

(お問い合わせ)

鳥取県病虫害防除所

(鳥取県園芸試験場内、電話：0858-37-4211)

この情報は、鳥取県病虫害防除所ホームページでも公開しています。

アドレスは、<https://www.pref.tottori.lg.jp/boujosyo/> です。



病虫害防除所ホームページ2次元コード