

## 西部圏域各種歯科健診結果について ～乳幼児期から学齢期～

項目	データ出典・資料作成	ページ数
乳幼児歯科健診結果	【データ出典】 鳥取県健康政策課 【資料作成】 鳥取県西部総合事務所米子保健所	P1～P8
学齢期歯科健康診査結果	【データ出典】 学校保健・安全・食育状況調査 (鳥取県教育委員会) 【資料作成】 鳥取県西部総合事務所米子保健所	P9～P12
妊婦歯科健康診査結果	【データ出典・資料作成】 鳥取県健康政策課	P13
歯周疾患検診結果	【データ出典・資料作成】 鳥取県健康政策課	P14～P15

## 西部圏域歯科健診結果（1歳6か月児）


- ・う蝕罹患率は、年々減少傾向である。
- ・令和5年度西部圏域のう蝕罹患率は、県平均より低かった。
- ・う蝕罹患率が西部圏域平均より低かった市町村は、日吉津村、大山町、南部町、日南町、日野町、江府町であった。

### 1歳6か月児歯科健診結果年次推移


年度	対象者数 (西部)	受診者数 (西部)	受診率	う蝕罹患率率 (%)		一人平均むし歯数 (本)		処置完了歯率 (%)	
				鳥取県	西部	鳥取県	西部	鳥取県	西部
H28	1974	1957	99.1	0.9	1.0	0.03	0.03	13.7	8.8
H29	1982	1928	97.3	1.1	1.6	0.03	0.04	7.0	8.5
H30	1912	1875	98.1	1.1	1.5	0.03	0.03	11.8	20.0
R1	1869	1817	97.2	0.9	1.4	0.02	0.03	4.3	5.1
R2	1795	1786	99.5	0.56	0.62	0.01	0.01	0.0	0.0
R3	1699	1673	98.5	0.75	1.20	0.02	0.04	7.6	8.2
R4	1589	1557	98.0	0.46	0.58	0.01	0.02	15.7	0.0
R5	1607	1585	98.6	0.6	0.4	0.01	0.01	4.7	0.0

	対象者	受診者	受診率 (%)	むし歯の ある子	罹患率率 (%)
米子市	1154	1141	98.9	5	0.4
境港市	201	200	99.5	1	0.5
日吉津村	34	32	94.1	0	0.0
大山町	68	67	98.5	0	0.0
南部町	56	56	100.0	0	0.0
伯耆町	50	47	94.0	1	2.1
日南町	17	16	94.1	0	0.0
日野町	12	11	91.7	0	0.0
江府町	15	15	100.0	0	0.0


米子市




境港市




日吉津村




大山町




南部町




伯耆町




日南町



日野町



江府町



## 西部圏域歯科健診結果（3歳児）


- ・う蝕罹患率は、年々減少傾向であるが、令和5年度は前年に比較して増加した。
- ・令和5年度西部圏域のう蝕罹患率は、県平均より高かった。
- ・う蝕罹患率が西部圏域平均より低かった市町村は、境港市、日吉津村、大山町、南部町、伯耆町、日南町、日野町、江府町であった。

### 3歳児歯科健診結果年次推移


年度	対象者数 (西部)	受診者数 (西部)	受診率 (%)	う蝕罹患率率 (%)		一人平均むし歯数 (本)		処置完了歯率 (%)	
				鳥取県	西部	鳥取県	西部	鳥取県	西部
H28	2054	2037	99.2	12.2	11.4	0.30	0.30	12.4	17.6
H29	1910	1896	99.3	12.6	14.9	0.36	0.43	12.6	15.0
H30	1982	1963	99.0	11.4	12.8	0.33	0.35	8.7	10.3
R1	1881	1852	98.5	9.9	11.8	0.27	0.29	11.1	15.1
R2	1502	1494	99.5	8.8	10.6	0.25	0.28	11.8	14.5
R3	1752	1721	98.2	8.2	10.5	0.23	0.31	10.7	12.4
R4	1919	1889	98.4	7.2	8.7	0.22	0.27	9.1	5.5
R5	1629	1602	98.3	7.8	9.4	0.23	0.31	11.7	14.6

	対象者	受診者	受診率 (%)	むし歯の ある子	罹患率率 (%)
米子市	1164	1147	98.5	126	11.0
境港市	205	205	100.0	13	6.3
日吉津村	36	36	100.0	2	5.6
大山町	75	75	100.0	2	2.7
南部町	52	48	92.3	4	8.3
伯耆町	60	56	93.3	3	5.4
日南町	16	14	87.5	1	7.1
日野町	9	9	100.0	0	0.0
江府町	12	12	100.0	0	0.0


米子市




境港市




日吉津村




大山町




南部町




伯耆町




日南町



日野町



江府町



## 保育所・幼稚園歯科健診結果（4歳児）


- ・う蝕罹患率は、減少傾向にある。
- ・令和6年度西部圏域のう蝕罹患率は、県平均と同程度であった。
- ・う蝕罹患率が西部圏域平均より低かった市町村は、境港市、日吉津村、南部町、伯耆町、日野町、江府町であった。

### 4歳児歯科健診結果年次推移


年度	対象者数 (西部)	受診者数 (西部)	受診率 (%)	う蝕罹患率(%)		一人平均むし歯数(本)		処置完了歯率(%)	
				鳥取県	西部地区	鳥取県	西部地区	鳥取県	西部地区
H28	1905	1852	97.2	27.5	29.2	1.09	1.20	29.5	32.0
H29	2121	2092	98.6	27.3	25.8	1.05	0.98	31.5	36.2
H30	1973	1931	97.9	24.0	24.1	0.94	0.98	30.4	34.6
R1	1855	1810	97.6	21.1	21.3	0.79	0.78	31.9	37.6
R2	1856	1830	98.6	21.7	21.3	0.81	0.85	28.5	31.0
R3	1819	1790	98.4	19.4	19.2	0.64	0.63	27.8	35.0
R4	1772	1738	98.1	16.4	16.0	0.51	0.52	27.4	34.0
R5	1702	1648	96.8	15.4	14.9	0.48	0.45	23.5	24.4
R6	1643	1611	98.1	13.7	13.4	0.46	0.45	21.7	25.2

	対象者	受診者	受診率 (%)	むし歯の ある子	罹患率 (%)
米子市	1124	1096	97.5	157	14.3
境港市	210	208	99.0	25	12.0
日吉津村	56	56	100.0	1	1.8
大山町	72	72	100.0	14	19.4
南部町	40	40	100.0	3	7.5
伯耆町	101	101	100.0	9	8.9
日南町	15	13	86.7	6	46.2
日野町	10	10	100.0	0	0.0
江府町	15	15	100.0	1	6.7


米子市




境港市




日吉津村




大山町




南部町




伯耆町




日南町



日野町



江府町



## 保育所・幼稚園歯科健診結果（5歳児）


- ・う蝕罹患率は、減少傾向にある。
- ・令和6年度西部圏域のう蝕罹患率は、県平均より低い傾向であった。
- ・う蝕罹患率が西部圏域平均より低かった市町村は、米子市、境港市、日吉津村、大山町、南部町、日野町であった。

### 5歳児歯科健診結果年次推移


年度	対象者数 (西部)	受診者数 (西部)	受診率 (%)	う蝕罹患率(%)		一人平均むし歯数(本)		処置完了歯率(%)	
				鳥取県	西部地区	鳥取県	西部地区	鳥取県	西部地区
H28	1906	1854	97.3	34.9	37.6	1.58	1.77	43.1	46.0
H29	2217	2173	98.0	35.4	34.7	1.52	1.48	42.3	43.4
H30	1867	1836	98.3	33.7	30.2	1.42	1.29	43.7	48.4
R1	1987	1956	98.4	30.5	31.4	1.25	1.29	40.2	44.4
R2	1913	1898	99.2	26.6	24.0	1.16	1.13	40.1	43.4
R3	1889	1870	99.0	26.4	27.1	1.06	1.09	37.7	42.0
R4	1836	1790	97.5	23.7	26.2	0.88	0.89	38.2	44.3
R5	1783	1738	97.5	22.4	21.6	0.78	0.73	35.4	38.7
R6	1685	1637	97.2	20.1	19.1	0.75	0.71	31.5	34.8

	対象者	受診者	受診率 (%)	むし歯の ある子	罹患率 (%)
米子市	1175	1138	96.9	213	18.7
境港市	216	208	96.3	41	19.7
日吉津村	34	33	97.1	2	6.1
大山町	94	93	98.9	18	19.4
南部町	58	58	100.0	9	15.5
伯耆町	78	77	98.7	21	27.3
日南町	11	11	100.0	3	27.3
日野町	10	10	100.0	2	20.0
江府町	9	9	100.0	3	33.3


米子市




境港市




日吉津村




大山町




南部町




伯耆町




日南町



日野町



江府町







## 小学生歯科健診結果


- 小学生は、永久歯の交換時期で、むし歯になりやすい。
- 令和5年度西部圏域のう蝕罹患率は、全国平均より高い傾向であった。

### 小学生う蝕罹患率%（平成28年度～令和5年度） 市郡別

	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
米子	52.3	50.6	47.8	45.9	46.5	43.0	40.7	40.5
境港	50.2	40.0	44.9	42.2	39.1	40.6	38.2	36.3
西伯	53.3	51.8	46.2	48.9	44.9	43.9	39.8	43.8
日野	58.4	49.5	46.6	50.0	47.0	48.2	45.9	43.3
鳥取県	53.8	51.9	50.6	49.5	47.8	45.9	42.5	40.7
全国	48.9	47.1	45.3	44.8	40.2	39.0	37.0	34.8



### 小学生未処置歯者（永久歯）%（平成28年度～令和5年度） 市郡別



出典：学校保健・安全・食育状況調査（鳥取県教育委員会）





※「未処置歯者（永久歯）」とは、未処置歯のある者のうち永久歯に未処置歯のある者の数。平成28年度から集計開始

## 中学生歯科健診結果


- 令和5年度西部圏域のう蝕罹患率は、全国平均より高い傾向であった。

### 中学生う蝕罹患率%（平成28年度～令和5年度） 市郡別

	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
米子	39.7	37.2	38.9	34.9	33.3	31.4	30.8	30.9
境港	38.8	38.3	41.4	33.9	32.8	41.5	44.7	29.2
西伯	38.3	32.8	32.4	32.0	34.3	31.1	25.7	21.1
日野	42.0	40.0	41.4	35.1	30.4	30.2	33.3	37.6
鳥取県	44.6	41.7	40.2	38.4	37.0	35.7	32.6	30.5
全国	37.5	37.3	35.4	34.0	32.2	30.4	28.2	27.9



### 中学生未処置歯者（永久歯）%（平成28年度～令和5年度） 市郡別



出典：学校保健・安全・食育状況調査（鳥取県教育委員会）


※「未処置歯者（永久歯）」とは、未処置歯のある者のうち永久歯に未処置歯のある者の数。平成28年度から集計開始

## 高等学校歯科健診結果


- 令和5年度西部圏域のう歯のない者の率は、県平均より高い傾向だった。

(%)

年 度	う蝕罹患率		う蝕の処置状況			
			処置完了者率		未処置歯のある者の率	
	鳥取県	全 国	鳥取県	全 国	鳥取県	全 国
H26	50.6	53.1	33.5	30.5	17.2	22.6
H27	52.7	52.5	35.6	29.9	17.2	22.6
H28	49.1	49.2	32.0	28.4	17.1	20.8
H29	48.1	47.3	32.5	27.6	15.9	19.7
H30	46.2	45.4	30.8	27.1	15.4	18.3
R1	46.0	43.7	30.5	26.4	15.6	17.3
R2	43.4	41.7	27.8	25.0	15.6	16.6
R3	40.7	39.8	25.9	24.1	15.6	15.7
R4	37.5	38.3	24.8	23.8	12.7	14.5
R5	36.0	36.3	24.3	22.4	11.7	13.9



### 高校生未処置歯者（永久歯）% （平成28年度～令和5年度）




出典：学校保健・安全・食育状況調査（鳥取県教育委員会）

※「未処置歯者（永久歯）」とは、未処置歯のある者のうち永久歯に未処置歯のある者の数。平成28年度から集計開始

## ◆鳥取県西部地域 う蝕罹患率（％）

- 各年代ごとのう蝕罹患率は年々減少傾向（実線矢印）にあるが、年代が上がるごとに高くなっている（赤点線矢印）。
- う蝕罹患率の傾向として、小学生で増加のピークを迎え、中学生で減少、高校生で再度増加に転じている。



西部地域	1歳半	3歳児	4歳児	5歳児	小学生	中学生	高校生
H26年度	1.6	17.1	30.5	42.0	51.8	42.2	50.1
H27年度	1.1	11.9	31.4	37.0	52.5	41.8	54.4
H28年度	1.0	11.4	29.2	37.6	53.6	39.7	48.4
H29年度	1.6	14.9	25.8	34.7	48.0	37.1	47.5
H30年度	1.5	12.8	24.1	30.2	46.4	38.5	45.0
R1年度	1.4	11.8	21.3	31.4	46.8	34.0	44.9
R2年度	0.6	10.6	21.3	24.0	44.4	32.7	40.9
R3年度	1.2	10.5	19.2	27.1	43.9	33.6	37.3
R4年度	0.6	8.7	16.0	26.2	41.1	33.6	34.2
R5年度	0.4	9.4	13.4	19.1	41.1	29.7	34.9

※小学生、中学生は参考データ(データ算出方法：西部4市郡の%の合計を平均して算出)


# 令和5年度 妊婦歯科健診実施市町村

鳥取県健康医療局健康政策課／令和6年9月

東部 (5)	鳥取市・岩美町・八頭町・若桜町・智頭町
中部 (5)	倉吉市・三朝町・湯梨浜町・琴浦町・北栄町
西部 (6)	伯耆町、日吉津村、大山町、日南町、日野町、江府町


鳥取県歯科保健推進計画  
～歯と口腔の健康づくりとっとりプラン(第2次)～

妊産婦歯科健診を実施する市町村の増加




各圏域	対象者	受診者数	受診率
東部	1,274	559	43.9%
中部	526	209	39.7%
西部	178	50	28.1%
県平均	1,978	818	41.4%

\* 16市町村実施



各圏域	う蝕罹患率
東部	92.1%
中部	88.0%
西部	86.0%
県平均	90.7%




各圏域	歯周病罹患率
東部	59.0%
中部	40.2%
西部	68.0%
県平均	54.8%


令和5年度 鳥取県歯周病検診結果の概要

表1 受診者数と受診率

市町村名	受診率(%)	対象者数(人)	受診者数(人)
1 鳥取市	2.6%	9,870	259
2 米子市	2.1%	7,747	164
3 倉吉市	10.9%	2,403	262
4 境港市	8.3%	1,737	145
5 岩美町	5.6%	644	36
6 若桜町	0.9%	224	2
7 智頭町	17.1%	357	61
8 八頭町	9.2%	898	83
9 三朝町	9.0%	368	33
10 湯梨浜町	12.5%	839	105
11 琴浦町	7.4%	825	61
12 北栄町	7.5%	805	60
13 日吉津村	9.8%	205	20
14 大山町	11.0%	829	91
15 南部町	6.6%	547	36
16 日野町	1.6%	129	2
17 江府町	7.6%	105	8
県平均	5.0%	28,532	1,428



年齢	性別	受診率	対象者数	受診者数
40歳代	男	3.1	3,320	104
	女	7.0	3,128	220
50歳代	男	2.4	3,981	96
	女	6.9	3,802	264
60歳代	男	2.9	3,089	90
	女	6.8	3,309	224
70歳代	男	4.7	3,831	180
	女	6.1	4,072	250
県平均		5.0	28,532	1,428



受診率はどの年代も女性が高く平均を超えている。  
男性はすべての年代で受診率が低く、特に50代男性が低い。(性別での差が広がっている)

表2 一人あたりの歯の本数(現在歯数)

年齢	(本)		
	男	女	平均
40歳代	28.8	28.5	28.6
50歳代	28.7	28.0	28.2
60歳代	27.6	27.1	27.2
70歳代	24.5	24.6	24.6
県平均	26.9	27.0	27.0

男女とも60歳代以降、歯の本数が減少傾向




表3 4mm以上の歯周ポケットを有する者の割合

年齢	性別	歯周ポケット
40歳代	男	65.4
	女	55.5
50歳代	男	65.6
	女	61.4
60歳代	男	62.2
	女	58.5
70歳代	男	70.0
	女	64.4
県平均		62.3

40歳代以上で4mm以上の歯周ポケットを持つ者は、6割であった。全ての年代で、女性より男性の方が歯周ポケットの割合が多い傾向。4ミリ以上の歯周ポケットは、歯周病の中等～重度の歯周病罹患を示し、歯周病が進むと歯の喪失リスクが高くなる。また歯周病は全身疾患と関りが大きく、定期的な歯科健診(検診)を受けることが歯周病や全身疾患の重症化予防につながる。





表4 デンタルフロスや歯間ブラシの使用割合


年齢	性別	（％）			
		a. 毎日	b. 週1回以上	c. 月1～3回	d. 使っていない
40歳代	男	22.1	21.2	18.3	37.5
	女	25.5	20.0	28.6	25.0
50歳代	男	21.9	21.9	10.4	44.8
	女	26.5	21.2	23.1	28.8
60歳代	男	31.1	13.3	14.4	40.0
	女	33.9	20.1	16.5	27.7
70歳代	男	30.0	12.2	11.1	46.1
	女	38.0	19.6	14.8	26.0
県平均		29.6	19.0	18.2	32.1



デンタルフロスや歯間ブラシ等の歯間清掃用具の使用状況は、60～70歳代女性の3割近くの者は毎日使用しているが、全体で見ると毎日使う者より使用していない者の方が多く、時々使うのは5、6人に1人である。40～50歳代と60～70歳代男性は毎日使用する人より使用していない者が多い。

表5 自覚症状など(歯やお口に満足していますか)


年齢	（％）			
	ほぼ満足	やや不満	不自由・苦痛	
40歳代	30.2	64.2	5.2	
50歳代	31.9	62.5	5.0	
60歳代	27.7	64.3	6.7	
70歳代	36.0	57.0	6.5	
県平均		31.9	61.6	5.9



歯やお口の満足度については、約7割の者が不満や不自由・苦痛を感じている。

表6 過去1年間に歯科健診を受診した者の割合


年齢	性別	（％）	
		受けた	受けていない
40歳代	男	37.5	61.5
	女	35.9	62.7
50歳代	男	26.0	74.0
	女	40.9	58.0
60歳代	男	45.6	54.4
	女	40.6	56.3
70歳代	男	41.7	55.0
	女	52.8	46.0
県平均		41.3	57.1



40～50歳代では歯科健診受診する割合は4割以下となっている。50代男性の歯科健診受診が最も低い状況。定期的な歯科健診による継続的な管理が口腔の健康において重要であり、全身の健康管理にも繋がることから啓発と行動変容を促すことが必要。

表7 喫煙状況(現在たばこを吸っていますか)

年齢	性別	（％）		
		吸わない	過去吸っていた	現在吸っている
40歳代	男	49.0	37.5	13.5
	女	79.5	15.5	4.1
50歳代	男	52.1	34.4	13.5
	女	79.5	15.5	4.2
60歳代	男	40.0	51.1	8.9
	女	87.5	6.7	3.6
70歳代	男	26.7	61.7	11.1
	女	90.4	6.0	1.6
県平均		69.5	23.4	6.1



女性の喫煙は3.3%。男性の喫煙は約1割程度。過去吸っていたが吸わなくなった人は、年代があがるにつれ増加傾向。喫煙する人は歯周病にかかりやすく治りにくい。症状も分りにくいため気づきにくい。また、口腔・咽頭がんのリスクがあることがわかってきている。